

Guía de enseñanza de enoxaparina

Uso previsto: La enoxaparina es un anticoagulante que se utiliza para impedir la formación o crecimiento de coágulos de sangre. La enoxaparina comienza su efecto en forma inmediata y puede utilizarse junto con warfarina (Coumadin®) hasta que la warfarina comience a ser efectiva.

Instrucciones:

1. Tómela siguiendo las indicaciones de su proveedor de atención médica.
2. Solicítele a una enfermera que le indique a usted o a otra persona la forma en la cual podrá aplicarse a sí mismo una inyección subcutánea. Si olvida una dosis, aplíquela tan pronto como le sea posible. Si es casi la hora de tomar la siguiente dosis, sátese la dosis faltante y restablezca el cronograma regular. NO aplique una dosis doble la próxima vez.
 - Aplique la inyección en la forma indicada en la "Guía domiciliaria de Tratamiento con Lovenox®" entregada.
 - Programe y concurra a todas las citas con su médico, de laboratorio y clínicas.
3. Informe a su médico clínico, oftalmólogo, farmacéutico y dentista que usted está recibiendo tratamiento con enoxaparina.
 - Ellos podrán tomar decisiones que disminuyan su riesgo de sangrado a la vez que se impide la formación de los coágulos de sangre.
4. Mantenga una lista completa de sus medicamentos.
 - Solicite ayuda si necesita asistencia para mantener su lista actualizada.
 - Lleve su lista de medicamentos consigo en todo momento.
 - Comparta su lista de medicamentos con sus médicos, dentista, farmacéutico o cualquier persona que lo atienda.

Precauciones:

1. Deseche las agujas y jeringas usadas en el "Recipiente para objetos punzocortantes" de color rojo entregado. Una caja de leche también funcionará siempre que la tapa cierre firmemente. El recipiente lleno y cerrado podrá desecharse junto con sus desperdicios domésticos.
2. Si usted necesita un analgésico de venta sin receta, solicítele a su proveedor de atención médica que le recomiende cuál es correcto para usted.

Notifique a su médico si presenta sangrado inusual o intenso:

Dónde no debería haber sangre:

- Orina
- Tos con sangre
- Sangrado nasal que no se detiene
- Movimiento intestinal
- Escupir sangre
- Vómitos con sangre

Sangrado que no se detiene o intenso:

- Los rasguños y cortes pequeños dejarán de sangrar. Si usted percibe que el sangrado o hematoma es inusual para usted, o si usted no puede detener el sangrado con compresas frías comuníquese con su médico.
- Sangrado menstrual intenso.

